



L'aigle de Bonelli est un rapace diurne mesurant entre 60cm et 70cm, et d'une envergure de 1m50 à 1m70. C'est une espèce rupestre et thermophile. Il occupe des habitats méditerranéens avec des reliefs marqués, depuis le niveau de la mer jusqu'à une altitude de 1500m. L'aigle vit dans des montagnes de basses et moyennes altitudes, et dans les garrigues. Il niche généralement sur des falaises, en maintenant un ou plusieurs nids en état. L'aigle se reproduit de février à juin, et ne pond que 2 oeufs. Les juvéniles acquièrent leur plumage adulte au bout de 3 à 4 ans. Les individus juvéniles subadultes possèdent un plumage plus fauve et roussâtre.

Comment le reconnaître?

L'adulte revête un plumage brun foncé sur son dos et le dessus de ses ailes, avec une tache blanche sur le dos, caractéristique de l'espèce, qui grandit avec l'âge. L'extrémité de la queue et des ailes sont noires. On le reconnaît également par son plumage blanc strié de noir sur le dessous. Le dessous des ailes montre une bande noire allant des épaules aux poignets, et laissant le bord intérieur des ailes blanc. La femelle est plus grande et plus trapue que le mâle. Cet aigle possède beaucoup de traits caractéristiques, mais il peut être confondu avec l'aigle botté (*Hieraetus pennatus*), pour la longueur de sa queue, égale voir supérieure à celle des ailes. En vol, la longue queue et la petite tête de l'aigle de Bonelli rappelle aussi la bondrée apivore (*Pernis apivorus*), particulièrement vue du dessous quand la lumière est mauvaise.

Où le trouver ?



Figure 1 : Évolution de la répartition française de l'Aigle de Bonelli entre 1950 et 2014

Pour vos connaissances ornithologiques !




Figure 2 : Schéma de l'anatomie de l'aigle de Bonelli


Un rapace qui a du caractère...

Ce rapace peut vivre 20 à 25 ans à l'état naturel. Il est discret, mais à la période de reproduction, il devient territorial, monogame et sédentaire. Mais il est aussi susceptible : s'il est dérangé sur son lieu de reproduction, il abandonne parfois son nid. Les jeunes sont très dispersifs, ce qui rend leur suivi et leurs observations difficiles. L'Aigle de Bonelli est un prédateur de vertébrés de moyenne taille. Il chasse dans son territoire, pouvant faire entre 40 et 120km² selon la disponibilité de ses ressources alimentaires. Il est persévérant et poursuit sa proie sans relâche. Il se nourrit de lapins, rongeurs, perdrix, lézards, particulièrement le lézard ocellé (*Timon lepidus*), corvidés, pigeons, et d'autres. Malgré sa petite taille, il est capable de se mesurer à de plus gros rapaces, comme l'aigle royal (*Aquila chrysaetos*) mesurant entre 80cm et 87cm.



© Maxime Harbourg

Conservez nos espèces !



Bien que l'espèce aie une préoccupation mineure à l'échelle internationale, elle est cependant menacée en Europe, et particulièrement en France, où elle est considérée comme « en danger ». Moins de 30 couples ont été recensés en France, et les populations d'aigles sont en déclin. L'homme est responsable d'une réduction du nombre de proies de l'aigle, et de la fragmentation de son habitat par les activités de loisir. Ce rapace est aussi tué lors d'électrocutions par des câbles électriques ou encore de collisions avec des éoliennes. Il est aussi victime de la chasse, alors que l'espèce est officiellement protégée. Toutefois, des organismes, tels que la LPO et l'UFCS, collaborent pour la conservation de l'espèce. Les jeunes individus sont bagueés en milieu naturel afin d'avoir un meilleur suivi, et des élevages en captivité sont organisés par l'UFCS afin d'augmenter les effectifs de la population.

Bibliographie

http://observatoireterapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20045
<http://www.aigledebonelli.fr/?q=node/66>

<https://www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.de.bonelli.html>
http://www.aigledebonelli.fr/sites/default/files/documents/PNA_Aigle_BD.pdf
Provence Méditerranée : Reconnaître toutes les espèces Edition Artémis Losange, Jean Marie Polese, Maurice Dupérat