



La genette commune est un mammifère carnivore diurne qui fait partie de la famille des Viverridés. Elle fréquente des habitats variés en partant des forêts méditerranéennes, des garrigues ou encore des futaies de végétaux : notamment celles de châtaigner ou de hêtre qui lui offrent un habitat « caché ».

Ces trente dernières années, la déprise agricole a favorisée la migration et donc l'installation de la Genette dans la région méditerranéenne. Ce phénomène vient de l'étalement des populations de Genette venant du Gard et de l'Ardèche.

Comment la reconnaître?

Sa principale caractéristique est sa longue queue rayée, pouvant atteindre jusqu'à 52 cm, non proportionnelle à sa hauteur (environ 35cm). En comptant la taille de son corps, cet animal peut atteindre jusqu'à 112cm.

La répartition de ses couleurs ainsi que de ses tâches est emblématique de l'espèce : du gris fauve sur tout le corps ; une ligne noire sur son dos ; des bandes noires tachetées le long du corps ; sa queue rayée verticalement ; et du blanc sous les yeux et autour du museau.

Elle possède un museau allongé et de grandes oreilles : c'est ce qui permet de faire la distinction avec un chat domestique (*Felis sylvestris catus*)



Le prédateur prédaté !


Les variations des conditions environnementales vont venir influencer directement le régime des Genettes.

Il se peut qu'elle vienne à se nourrir de reptiles, amphibiens ou encore de végétaux. Ce carnivore peut donc adapter son alimentation en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve.

Son régime alimentaire est étudié grâce aux fèces trouvés sur son territoire.

Mais, ce prédateur est aussi prédaté : il sert de ressource alimentaire à différents grands carnivores comme le loup (*Canis lupus*) ou encore le lynx (*Lynx*). Cependant son plus grand prédateur est en réalité le Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*). Ainsi, il est aussi la proie d'autres prédateurs : les rapaces diurnes.

Conservez nos espèces !



En Europe et en France, la Genette est considérée comme étant en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge de l'IUCN.

Cette espèce est très prisée par l'Homme notamment pour sa fourrure mais aussi pour des usages médicaux dans de nombreux pays européens et africains malgré sa place sur la liste rouge de l'IUCN.

De plus, d'autres facteurs anthropiques viennent s'ajouter à ça comme la déforestation pour l'urbanisation ou encore pour l'exploitation agricole.

Mais, par le passé, la Genette était considérée comme un animal domestique pour faire fuir les rongeurs des bâtisses et des champs.

Où la trouver ?



Figure 2 : Répartitions de la Genette commune en France métropolitaine 2008 (ONCFS (Wikipédia))
Jaune : zone de présence irrégulière
Vert : zone de présence régulière.

Un peu de génétique...

Ce carnivore nocturne fait partie du groupe monophylétique des Mammifères. Les Viverridés se sont divisés en 4 sous-familles (Genettes, Civettes palmiste Paradoxurus hermaphroditus, Binturongs Arctictis binturong et Civettes terrestres) il y a 25 millions d'années. Les Genettes seraient arrivées sur le continents africain il y a environ 20 millions d'années, quand l'Asie était collée à l'Afrique.

La Genette se divise donc en une trentaine de sous espèces - comme *Genetta genetta dongolana* (Afrique du Nord)



Bibliographie

https://www.faune-paca.org/index.php?m_id=20083
<http://storage.canalblog.com/25/09/45/1329/51904934.pdf>
<https://www.manimalworld.net/pages/viverridae/genette-commune.html>
<https://www.manimalworld.net/pages/viverridae/genette-tigrine.htm>

<http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/genette-observee-champsaur>
https://www.parc-animalier-pyrenees.com/fiche_animal/La-genette/121
<https://blog.defi-ecologique.com/genette-commune/>